

L'utilisation de la **venlafaxine (Effexor XR®)** chez les enfants et les adolescents



Aperçu

La venlafaxine (Effexor XR®) appartient au groupe de médicaments appelés antidépresseurs. La venlafaxine peut également être utilisée pour traiter plusieurs autres maladies.

Dans quels cas utilise-t-on la venlafaxine?

Tout comme de nombreux médicaments utilisés pour traiter les troubles de l'enfance, l'utilisation de la venlafaxine n'a pas été approuvée par Santé Canada pour les enfants et les adolescents. Lorsque les effets bénéfiques éventuels (p.ex., l'atténuation de vos symptômes) découlant de l'utilisation de la venlafaxine l'emportent sur les risques potentiels (p.ex., les effets secondaires), bon nombre de médecins peuvent la prescrire pour traiter :

- La dépression
- La dépression associée au trouble bipolaire
- Le trouble d'anxiété généralisée
- Troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention (THADA)
- Autres troubles de l'anxiété tels que la phobie sociale

Votre médecin pourrait vous prescrire ce médicament pour une autre raison. Si vous avez des doutes sur les raisons pour lesquelles on vous prescrit ce médicament, veuillez demander des explications à votre médecin.



Comment la venlafaxine agit-elle?

La venlafaxine est un « inhibiteur de recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline » (IRSN). Cela signifie qu'elle augmente la quantité de certaines substances chimiques, appelées la sérotonine et la norépinéphrine, dans le cerveau. On pense que ces substances chimiques ne fonctionnent pas de manière efficace chez les personnes atteintes de dépression. Le mécanisme exact grâce auquel la venlafaxine améliore les symptômes de la dépression n'est pas encore complètement connu. L'action

de la venlafaxine sur la norépinéphrine a pour effet d'activer des régions du cerveau qui contrôlent les actes impulsifs, l'attention et les mouvements du corps, permettant ainsi une amélioration des symptômes associés au THADA.

Dans quelle mesure la venlafaxine est-elle efficace pour les enfants et les adolescents?

La venlafaxine a fait l'objet d'études auprès des enfants et des adolescents aux prises avec des troubles de l'anxiété. Dans certaines études réalisées auprès d'enfants et d'adolescents atteints de dépression, il a été observé que les médicaments tels que la venlafaxine étaient bénéfiques **pour 5 ou 6 personnes environ sur 10 personnes traitées**. Certains de ces essais ont révélé que la venlafaxine n'était pas plus efficace contre les symptômes de la dépression qu'un placebo (une pilule inactive qui ressemble au médicament). Dans une étude portant sur des patients atteints du trouble d'anxiété généralisée, **près de 7 personnes sur 10** à qui on avait administré de la venlafaxine pendant 8 semaines constataient une amélioration de leur situation.

En général, les jeunes atteints de dépression qui se voient prescrire la venlafaxine pour 2 à 3 mois devraient constater une amélioration des symptômes de dépression qu'ils présentent (*tels que l'amélioration de l'humeur, un meilleur sommeil, plus d'énergie et une concentration accrue*). Dans la mesure du possible, le recours à une thérapie comportementale, telle que *la thérapie interpersonnelle (TIP) pour la dépression* ou *la thérapie cognitivo-comportementale (TCC)* en complément du médicament pourrait aider à maximiser les avantages possibles.

Comment la venlafaxine doit-elle être prise?

En règle générale, la venlafaxine doit être prise une ou deux fois par jour avec ou sans nourriture. Ce médicament devrait être pris à la même heure chaque jour selon les recommandations de votre médecin. Essayez de le prendre en même temps qu'une de vos activités quotidiennes (par exemple, au moment de prendre votre déjeuner ou de vous brosser les dents) pour ne pas l'oublier. Évitez de consommer de l'alcool lorsque vous prenez de la venlafaxine.

Avalez les capsules entières de venlafaxine à libération prolongée avec le liquide. Vous pouvez répandre tout le contenu des capsules sur une petite quantité de compote de pommes lorsque vous devez prendre votre dose. Toutefois, si vous répandez le contenu de la capsule sur de la compote de pommes, buvez un liquide après pour vous assurer que vous avez avalé tout le contenu. Les capsules et leur contenu **ne doivent être ni divisés, ni écrasés, ni mâchés** ou placés dans l'eau.

En règle générale, votre médecin commencera par vous prescrire une faible dose de venlafaxine. On augmentera progressivement cette dose en fonction de la manière dont vous réagissez au traitement. Vous et votre médecin pourrez alors discuter du meilleur dosage à continuer à prendre en fonction de votre tolérance au médicament (la mesure dans laquelle le médicament est efficace et la manière dont vous supportez les effets secondaires du médicament) et de la mesure dans laquelle il aide à réduire vos symptômes.

Quand la venlafaxine commencera-t-elle à avoir de l'effet?

Il faut prendre la venlafaxine 3 à 6 semaines avant de commencer à mieux vous sentir. Les différents symptômes pourraient commencer à s'améliorer à des différentes phases. À titre d'exemple, des améliorations en ce qui concerne le sommeil, l'appétit et l'énergie peuvent être observées dans les deux premières semaines.

Parfois, les autres remarqueront les améliorations que vous connaissez avant que vous ne le remarquiez vous-même. L'ensemble des effets bénéfiques pourrait prendre 4 à 8 semaines (ou plus longtemps) pour se manifester. **Compte tenu du fait qu'il faut de temps pour que ce médicament ait un effet, même si vous vous sentez mieux, n'augmentez pas, ne diminuez pas ou n'interrompez pas la prise de ce médicament sans en avoir discuté avec votre médecin en premier lieu.**

Si vous ne vous sentez pas mieux dans les 6 à 8 semaines suivant le début de votre traitement, votre médecin pourrait vous recommander de prendre un autre médicament. Il existe de faibles risques que les symptômes attribués à la dépression s'aggravent ou que vous développiez plus de pensées autodestructrices durant les premiers mois de prise de ce médicament (voir la partie sur les effets secondaires). Si cela est le cas, avisez votre médecin

IMMÉDIATEMENT.



Pendant combien de temps dois-je prendre la venlafaxine?

Cela dépend des symptômes que vous présentez, de leur fréquence et de leur durée. La plupart des personnes doivent prendre ce médicament pendant au moins 6 mois. Cela laisse le temps à vos symptômes de se stabiliser et vous permet de retrouver votre fonctionnement normal. Après cette période, vous et votre médecin devriez discuter des avantages et des risques si vous décidez de continuer le traitement.

Si vous avez eu plusieurs crises de dépression grave et que vous tolérez bien ce médicament, il pourra vous être demandé de prendre ce médicament pour une durée indéfinie. En continuant à prendre ce médicament, vous réduisez de manière significative le risque d'avoir une autre crise de dépression. **N'arrêtez PAS de prendre ce médicament (même si vous vous sentez mieux) avant d'en avoir discuté avec votre médecin en premier lieu. Si vous interrompez votre traitement soudainement, il est possible que vos symptômes réapparaissent ou que vous éprouviez une mauvaise réaction.**

Une fois que vous avez commencé à prendre ce médicament, il faudra surveiller avec votre médecin les effets bénéfiques ainsi que les effets secondaires. Votre médecin vérifiera les progrès que vous réalisez et discutera avec vous des changements dans les symptômes au cours des trois mois suivants pour confirmer que ce médicament agit de manière efficace et que les effets secondaires possibles sont prévenus. À ce moment-là, vous pourrez discuter de la durée de prescription du médicament.



Conseil : Utiliser l'outil **intitulé Antidepressant Monitoring Form for Children and Adolescents** (*Formulaire de surveillance de l'antidépresseur pour enfants et adolescents*) pour vous aider à mesurer les progrès que vous réalisez pendant que vous suivez ce traitement.

La venlafaxine crée-t-elle une dépendance?

Non, la venlafaxine ne crée pas de dépendance. Vous ne ressentirez aucun « état de manque » que certaines personnes ressentent avec la nicotine ou les drogues illicites. Si vous et votre médecin décidez qu'il vaut mieux pour vous d'arrêter de prendre de la venlafaxine, votre médecin vous expliquera comment baisser la dose en toute sécurité afin que vous ne subissiez pas les effets désagréables « similaires à une grippe » qui pourraient s'ensuivre (frissons, nausée, vomissements, picotements dans les mains et les pieds, douleurs musculaires, fièvre et sensations électriques) pendant que votre organisme se réadapte à l'absence de ce médicament.

Quels sont les effets secondaires de la venlafaxine et que dois-je faire si j'en fais l'expérience?

Comme pour la plupart des médicaments, vous pourriez subir des effets secondaires en prenant de la venlafaxine. La plupart des effets secondaires sont modérés et temporaires. Les effets secondaires pourraient se manifester avant les effets positifs. Il est possible que certaines personnes soient aux prises avec des effets secondaires qu'ils jugent graves et durables. Si vous jugez que cela est votre cas, consultez votre médecin sans plus attendre.

Sur la page suivante, vous trouverez une liste de certains des effets secondaires les plus courants et des effets secondaires potentiellement graves que peut induire la prise de ce médicament.

Des suggestions sur les manières de réduire ces effets sont indiquées entre parenthèses.

Effets secondaires courants

Les effets secondaires pourraient se manifester plus fréquemment au moment de commencer à prendre un médicament ou après l'augmentation de la dose administrée. Si l'un de ces effets secondaires devient trop inconfortable, veuillez en parler avec votre médecin, votre infirmier ou votre pharmacien.

- Constipation (*faites plus d'exercice physique, buvez davantage, mangez plus de légumes, de fruits et de fibres*)
- Diminution de l'appétit (*essayez de manger des repas plus fréquents et moins consistants*)
- Somnolence (*prenez votre le médicament à l'heure du coucher; l'effet s'estompe en général au fil du temps*)
- Troubles du sommeil (*essayez de prendre le médicament plus tôt dans la journée*)
- Vertige (*essayez de vous lever lentement lorsque vous êtes assis ou allongé*)
- Sécheresse de la bouche (*essayez de mâcher de la gomme sans sucre, des bonbons acidulés, des morceaux de glace ou des sucettes glacées*)
- Sentiment d'agitation/de trop-plein d'énergie (*évitez les boissons énergisantes, à base de cola et de café qui contiennent de la caféine*)
- Transpiration excessive (*les antisudorifiques forts peuvent aider; parlez à votre médecin ou votre pharmacien*)
- Maux de tête (*essayez d'utiliser un analgésique tel que l'acétaminophène (Tylenol® ordinaire)*)
- Maux d'estomac ou nausée (*essayez de prendre la dose de venlafaxine avec de la nourriture*)
- Rêves d'apparence réelle que vous n'avez pas l'habitude de faire
- *Chez les adolescents ou les adultes : Changements de la performance ou de l'intérêt sexuel (discutez-en avec votre médecin)*

Effets secondaires rares (p. ex. ceux observés chez moins de 5 % des patients)

Communiquez avec votre médecin IMMÉDIATEMENT si vous éprouvez l'un des effets secondaires suivants :

- Humeur changeante qui passe à un état d'agitation, d'irritabilité ou de bonheur inhabituel.
- Spasmes ou rigidité musculaire
- Attaques (également appelés crises ou convulsions)
- Éruptions cutanées, démangeaisons ou urticaire
- Pensées autodestructrices, hostiles ou suicidaires
- Sentiment gênant de nervosité ou d'agitation intérieure
- Hématomes ou saignements inhabituels

Quelles précautions mon médecin et moi-même devrions-nous prendre lorsque je prends de la venlafaxine?

Informez votre médecin ou pharmacien si :

- vous commencez à prendre tout autre médicament (sous prescription ou non), car plusieurs autres médicaments peuvent interagir avec la venlafaxine
- vous vous sentez somnolent, étourdi ou au ralenti. La venlafaxine peut entraîner ces effets secondaires de manière temporaire chez les personnes qui prennent le médicament. La venlafaxine pourrait augmenter les effets de l'alcool, et causer ainsi un effet sédatif et des étourdissements plus importants. Si vous êtes touchés par ce genre d'effets, il est important d'éviter de conduire de la machinerie lourde ou une voiture.
- vous avez des antécédents de diabète, de maladie cardiaque, de maladie thyroïdienne, de maladie du rein ou du foie ou de crises d'épilepsie.
- vous avez des allergies ou avez déjà eu une réaction à un médicament
- vous avez des changements d'humeur ou des pensées autodestructrices
- vous développez tout nouveau problème de santé pendant que vous prenez la venlafaxine
- si vos menstruations se font attendre, que vous tombez enceinte ou que vous tentez de tomber enceinte, ou que vous allaitez

Quelles instructions particulières devrais-je suivre lorsque je prends la venlafaxine?



- Gardez tous vos rendez-vous avec votre médecin et le laboratoire.
- N'autorisez personne à prendre vos médicaments.
- Il serait judicieux d'aller voir votre médecin ou de l'appeler dans les deux premières semaines suivant le début de votre traitement à base de venlafaxine, puis de manière régulière pour surveiller l'efficacité du médicament, votre tolérance à ce dernier et pour parler des problèmes que vous pourriez avoir.

Que dois-je faire si j'oublie de prendre une dose de venlafaxine?

Si vous oubliez de prendre une dose de ce médicament, prenez-la dès que possible. Toutefois, si vous devez bientôt prendre la dose suivante (p.ex., dans les 4 heures qui suivent), ne prenez pas la dose que vous avez oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Au lieu de cela, continuez de suivre votre horaire de dosage normal.



Quelles sont les conditions d'entreposage requises pour la venlafaxine?

- Conservez ce médicament dans l'emballage d'origine, entreposé à la température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur (p.ex., pas dans la salle de bain ou la cuisine).
- Gardez ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.

Vous pouvez partager cette information avec les membres de votre famille afin qu'ils comprennent les traitements qui vous sont offerts. Compte tenu du fait que les besoins de chaque personne sont différents, il est important que vous suiviez les conseils qui vous sont prodigués par votre propre médecin, infirmier ou pharmacien et que vous leur parliez si vous avez la moindre question concernant ce médicament.

Élaboré par les professionnels de la santé du Programme de santé mentale pour les enfants et les adolescents et révisé par le personnel du Kelty Mental Health Resource Centre .